

インフルエンザ予防接種予診票

接種希望の方へ:太ワク内にご記入ください。

診察前の体温				度		分			
住 所	〒								
ふ り が な	受 け る 人 の 氏 名					男	TEL	— —	
保 護 者 の 氏 名 (18 才 未 満)							生年月日	昭 平 年 月 日 (満 歳 カ月)	

質 問 事 項		回 答 欄		医師記入欄
今日受ける予防接種について説明文(裏面)を読んで理解しましたか。		いいえ	はい	
今日受けるインフルエンザ予防接種は今シーズン1回目ですか。 ()回目 前回の接種は(月 日)		いいえ	はい	
現在、何か病気にかかっていますか。 病名()		はい	いいえ	
治療(投薬など)を受けていますか。		はい	いいえ	
その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。		はい	いいえ	
今日、体に具合の悪いところがありますか。		はい	いいえ	
具体的な症状を書いてください。()				
これまでに、特別な病気(心臓血管系、腎臓、肝臓、血液疾患、免疫不全症など)にかかったことがありますか。		はい	いいえ	
病名()		はい	いいえ	
その病気をみてもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。				
最近1ヶ月以内に、家族や周囲に、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどの病気の方がいましたか。		はい	いいえ	
病名 ()		はい	いいえ	
最近1ヶ月以内に予防接種を受けましたか。				
予防接種の種類 ()		はい	いいえ	
これまでにインフルエンザ以外の予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか。		はい	いいえ	
予防接種の種類 ()				
薬や食品(鶏肉、鶏卵など)で皮膚に発疹やじんましんが出たり、具合が悪くなったことがありますか。		はい	いいえ	
ひきつけ(けいれん)をおこしたことがありますか。()歳頃		はい	いいえ	
そのとき熱がでましたか。		はい	いいえ	
近親者に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか。		はい	いいえ	
近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか。		はい	いいえ	
今日の予防接種について質問がありますか。		はい	いいえ	
(女性のみ)現在妊娠している、又は妊娠している可能性はありますか。		はい	いいえ	

医師の記入欄	以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は (可能 ・ 見合わせる)。 保護者に対して、予防接種の効果・目的、接種するワクチンの有益性及び副反応並びに予防接種健康被害救済制度について説明をした。
医師の署名又は記名押印	

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果・目的、接種するワクチンの有益性、重篤な副反応の可能性などについて理解した上でインフルエンザHAワクチン(4価ワクチン)[国内産ワクチン]の接種を (希望します ・ 希望しません)。	
令和 年 月 日 本人(もしくは保護者)の署名	
※自署できない者は代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載。 続柄()	

インフルエンザHAワクチン Lot.No.	皮下接種 0.5 ml	〒273-0036 千葉県船橋市東中山1-18-10 TEL 047(334)2686 医療法人社団ディーオーアイ 土居内科医院 接種年月日 令和 年 月 E
---	----------------	---

インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザの予防接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票に出来るだけ詳しくご記入ください。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入下さい。

【ワクチンの効果と副反応】

予防接種により、インフルエンザの発病を阻止したり、インフルエンザによる合併症や死亡などを予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱、蜂巣炎などがみられることがあります。過敏症として、発しん、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、そう痒、血管浮腫、精神神経系として、頭痛、一過性の意識消失、めまい、顔面神経麻痺等の麻痺、末梢性ニューロパチー、失神、血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、消化器として、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、筋・骨格系として、関節痛、筋肉痛、筋力低下があらわれることがあります(いずれも頻度不明)。その他に、発熱、悪寒、倦怠感、リンパ節腫張、咳嗽、動悸、ぶどう膜炎があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は、重篤な副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。

非常にまれですが、次のような重篤な副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎、脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれんを含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(アレルギー性紫斑病、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎等)、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、(12)ネフローゼ症候群、このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて救済手続きを行うことになります。

【予防接種を受けることができない人】

1. 明らかに発熱のある人(37.5℃以上の人)
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3. 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人
又は、過去にその他の原因でアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いで下さい。
4. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

【予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人】

1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
3. かぜなどの症状が出はじめたと思われる人
4. 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱のみられた人及び発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんが出たり、体に異常をきたしたことがある人
6. これまでにひきつけ(けいれん)を起こしたことがある人
7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことのある人
8. 妊娠している人
9. 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人

【ワクチン接種後の注意】

1. インフルエンザワクチンの接種を受けたあと30分間は、急な副反応が起きることがあります。
接種した医療機関に留まるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
2. 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすったりは避けましょう。
3. 接種当日はいつも通りの生活をしていただいてもかまいません。ただし、激しい運動は避けましょう。
4. 万一、接種後、接種局所の異常反応や体調の変化があらわれた場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。